

produkter

Virkon® S



Virkon® S är ett patenterat biologiskt nedbrytbart desinfektionsmedel, som är effektivt mot virus, mykoplasma, bakterier, svampar och sporer.

Virkon S kan användas i djurstallar, växthus, kläckerier, djurkliniker, potatislager, transportfordon m m och till föremål i anslutning här till t ex vid stövel desinfektion och desinfektion av fiberoptiska instrument. **Virkon S** användes också vid luft- och vattendesinfektion och till desinfektion av djur.

Virkon S är i vattenlösning helt riskfritt att använda för djur och människor.

Effekt

Virkon S innehåller sulfaminsyra, äppelsyra, kaliumpersulfat, natriumklorid, natriumhexametäfosfat, anjontensid samt färgämne och parfym.

Virkon S har effekt på alla kända virusfamiljer, som påverkar djur och människor. **Virkon S** verkar genom att tränga in i mikroorganismerna och förstöra arvsanlagen. Detta medför att en mycket effektiv desinfektion erhålles. **Virkon S** har effekt mot virus som förorsakar t ex Aujeszky's sjukdom, Newcastlesjuka, mul- och klövsjuka, rabies och dessutom mot bakterier och svampar, såsom jäst och mögel. **Virkon S** har också effekt mot virus som orsakar bl a virusabort, virusarterit och hästinfluensa samt bakterier som förorsakar kvarka. **Virkon S** dödar också virus som förorsakar leukos hos nötkreatur.

Användning

Virkon S är lätt att använda. Pulvret är lösligt i vatten. I **Virkon S** finns tillsatt en färgindikator som gör att lösningen blir ljusröd. När färgstyrkan bleknar avtar lösningens effekt och man bör göra i ordning en ny lösning. Genomsnittlig hållbarhet efter en upplösning av pulvret är ca 7 dagar. Tiden är beroende av lagringstemperaturen och eventuella tillkommande orenheter i samband med tillredning.

Virkon S löses i vatten enligt doseringsanvisningen och sprutas ut med ryggspruta, högtryckstvätt med lågt tryck eller annan lämplig utrustning. Vid användning av högtryckstvätt med injektor måste denna kunna ställas in på minst 12% men helst 20%,

annars måste brukslösningen blandas i kar eller tunna och sugas upp direkt med tvättaggregatet. Åtgång vid stalldesinfektion är 0,2 - 0,3 lit/m² behandlad yta, vid användning av 1 %-ig brukslösning.

Vid användning på plast- och gummimattor sköljes ytan efter avslutad desinfektion för att undvika bildning av vita fläckar efter upptorkning. **Virkon S** kan också spridas genom dimning.

Observera: All desinfektion skall föregås av rengöring med högtryckstvätt eller rotborste och vatten. **Virkon S** kan lösas upp till 6,5% i 20° C vatten.

Utblandad lösning bör ej vara i permanent kontakt med mjuka metaller som t ex aluminium, koppar eller mässing pga risk för korrosion. Känsliga ytor och sprayutrustning sköljes efter användning.

I pulverform är **Virkon S** irriterande på hud och ögon. Använd skyddshandskar vid tillredning av brukslösning. I upplöst form, vid sporadisk användning, behövs ingen skyddsutrustning, men användning av handskar rekommenderas som vid allt våtarbete där kemikalier används.

Bruksanvisning	Lösnings-koncentration	Virkon S per liter vatten
Desinfektion av stallar, växthus och andra lokaler, samt transportfordon	1%	10 g
Desinfektion vid parvovirus	2%	20 g
Rengöring och desinfektion av instrument (låt verka i max 10 min)	0,5-1%	5-10 g
Desinfektion av vattenledningssystem (låt verka i minst 30 min, spola rent)	0,25-1,0%	2,5-10 g
Kontinuerlig desinfektion av dricksvatten	0,1%	1 g
Dimning efter ytdesinfektion (1-2 lit lösning åtgår till 100 m ³)	1%	10 g
Luftdesinfektion över djur	0,5%	5 g
Huddesinfektion på djur	1%	10 g

Deklaration

Förpackningsstorlekar: 50 g, 500 g, 2,5 kg och 5 kg.

Det blå doseringsmättet på 500 grams förpackningen rymmer 10 ml=10 g.

Förpackningarna 2,5 kg och 5 kg innehåller ett doseringsmätt som rymmer 200 g.

Förpackningarnas gula lock rymmer 500 g (struket mått).

Förvaring: Torrt vid rumstemperatur.

Hållbarhetstid: Tillredd lösning skall förbrukas inom 7 dagar.

Tillverkare: Antec Int. Ltd, Suffolk, England